

Congres Suïcidaliteit in de GGZ 29 februari 2024 11.30 – 12.15

Klinische differentiatie van suïcidaliteit

Remco de Winter

www.suïcidaliteit.nl




Disclosure

(potentiële) belangenverstrengeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	
• Sponsoring of onderzoeksgeld	• Geen
• Honorarium of andere (financiële) vergoeding	• Geen
• Aandeelhouder	• Geen
• Andere relatie, namelijk ...	• Geen




www.suicidaliteit.nl




GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Prevalentie suïcidaliteit



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Paars = bekend in GGZ



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Suïcidaliteit frequent voorkomend in GGZ

Crisisdienst Den Haag (periode 4 jaar)

n = 14.705

- 33.2% van alle beoordelingen i.v.m. suïcidaliteit
- 28% daarvan (9,2% van totaal) beoordeling na een poging

Het vóórkomen van suïcidaal gedrag en
suïcidepogingen bij de psychiatrische
crisisdienst

R.F.P. DE WINTER, M.H. DE GROOT, M. VAN DASSEN, M.L. DEEN, D.P. DE BEURS

Research Trends



Outreach Psychiatric Emergency Service

Characteristics of Patients With Suicidal Behavior
and Subsequent Policy


Remco F. P. de Winter^{1,2,3}, Mirjam C. Hazewinkel³, Roland van de Sande^{3,5},
Derek P. de Beurs⁴, and Marieke H. de Groot²

Two classifications suicidaliteit als symptoom:

- Borderline persoonlijkheidsstoornis
- Depressieve stoornis
- *Echter bij voorkomend bij veel verschillende classificaties*

Het aandeel suïcides door patiënten met een stoornis waarvan de ggz-behandeling thans niet meer vergoed wordt

A.T. SPUIJBROEK, Y.M. LEEZER, D.P. DE BEURS, R.F.P. DE WINTER



Suïcide

Zeldzaam

1. Altijd te voorkomen?
2. Dodelijkste fenomeen in de psychiatrie?
3. Slechtste uitkomstmaat in de GGZ?

> Grote stress voor iedereen



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Noodzaak om suïcidaliteit te onderscheiden?

- "In richtlijnen", geen duidelijk onderscheid!
- Gemeenschappelijke taal vinden?
- Bepalen van behandelsetting?
- Verschillende behandelopties?
- "personalized medicine' ?
- Verschillende verantwoordelijkheden en juridische consequenties?
- Verbetering risicotaxatie minder handelingsverlegenheid?
- Bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek?



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Historische Subtypen

Emile Durkheim 1897

- “Egoistic suicide”
- “Altruistic suicide”
- “Anomic suicide”
- “Fatalistic suicide”



- Vergelijkbare ontwikkelingen?

Schneidman Menninger Shneidman

Henderson & Williams Mintz Leonard Baechler


- Ook meer kwalitatief onderzoek
- Maar.....

- Waar is de validering!?



Ontstaan suïcidaliteit is heel divers

(Dutch guideline 2012)



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Persoonlijke Noodzaak (subtypen)

- mee geconfronteerd
- *Slapeloosheid.....*
- Serieus maar uitwaaiend symptoom.....
- Verschillende manifestaties van het heterogene fenomeen
- Weinig vindbaar in literatuur, iedereen heeft wel een mening



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Combinatie theorie en praktijk (ingewikkeld)

- 2 van 5 dimensies psychopathologie (CPRS: Jaap Goekoop) (interacting networks)
 - Perceptual disintegration
 - Emotional dysregulation
- 4 van 7 dimensies persoonlijkheid (TCI: Robert Cloninger)
- Temperament: **Novelty-seeking/Harm-Avoidance**
- Character: **Cooperativeness/Self-directedness**




Winter, R.F.P. de (2009)

Towards an improvement of the differentiation of depressive disorders. A multidimensional approach

Doctoral Thesis

Voorgestelde subtypen

- **P**erceptuele **D**esintegratie(PD),
- **P**rimaire **D**epressieve **C**ognitie (PDC),
- **P**sychosociale“ **T**urmoil” (PT),
- **I**nadequate **C**oping/communicatie (IC)



Primary Depressive Cognition (PDC)

- ▶ Depressive cognition
- ▶ Stress/vulnerability ↑

Perceptual Desintegration (PD)

- ▶ Psychotic/nihilistic
- ▶ Reality testing ↓

Mental Health / Society

Mental Health/Society

Entrapment

Mental Health / **Society**

Mental Health/Society

Psychosocial Turmoil (PT)

- ▶ Experiencing serious loss
- ▶ Reactive depressive thoughts

Inadequate Coping (IC)

- ▶ inadequate coping/communication/
emphasising emotional pain
- ▶ Entrapment counsellors

Acute/chronische suicidaliteit hypothesen

Chronisch?

1. Primaire Depressieve Cognitie (PDC),
2. Inadequate Coping/communicatie(IC) **Acuut op chronisch?**

Acuut?

3. Perceptuele Desintegratie (PD)
4. Psychosociale "Turmoil" (PT)



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Uitleg subtypes

Living Reference Work Entry
Suicide Risk Assessment and Prevention pp 1–19 | Cite as

Home > [Suicide Risk Assessment and Prevention](#) > Living reference work entry

Differentiation of Suicidal Behavior in Clinical Practice

Remco F. P. de Winter , [Connie Meijer](#), [Nienke Kool](#) & [Marieke H. de Groot](#)

Living reference work entry | First Online: 12 June 2022

Diagnostiek en behandeling van suicidaliteit; een kwestie van maatwerk

H.J.E. Mennen, S.P.A. Rasing, R.F.P. de Winter, M. van den Bogaard, M. van den Berg, M. van Rossum, D.H.M. Creemers

20 Beoordeling van het suïciderisico

Marieke de Groot en Remco de Winter

- 1 Meetinstrumenten
 - 1.1 Wat is suïcidaal gedrag?
 - 1.2 Problemen met de validiteit
- 2 Klinisch onderzoek voor beoordeling suïciderisico

de Winter et al. *BMC Psychiatry* (2023) 23:878
<https://doi.org/10.1186/s12888-023-05374-8>

RESEARCH BMC Psychiatry **Open Access** 

A first study on the usability and feasibility of four subtypes of suicidality in emergency mental health care

Remco F. P. de Winter^{1,2,3,4*}, Connie M. Meijer⁵, Anne T. van den Bos¹, Nienke Kool-Goudzwaard³, John H. Enterman³, Manuela A.M.L. Gemen¹, Chani Nuij⁴, Mirjam C. Hazewinkel³, Danielle Steentjes¹, Gabrielle E. van Son¹, Derek P. de Beurs^{4,6} and Marieke H. de Groot⁷

JMIR Publications
Advancing Digital Health & Open Science

Articles | JMIR Research Protocols | Journal Information | Browse Journal

Published on 11.8.2023 in Vol 12 (2023)

Preprints (earlier versions) of this paper are available at <https://preprints.jmir.org/preprint/45438>, first published December 31, 2022.

A Clinical Model for the Differentiation of Suicidality: Protocol for a Usability Study of the Proposed Model

Remco F P de Winter^{1, 2, 3} , Connie M Meijer⁴ , John H Enterman⁵ , Nienke Kool-Goudzwaard⁵ , Manuela Gemen¹ , Anne T van den Bos¹ , Danielle Steentjes¹ , Gabrielle E van Son¹ , Mirjam C Hazewinkel⁵ , Derek P de Beurs^{2, 6} , Marieke H de Groot⁷ 

Perceptuele desintegratie

- Psychotische symptomen
- Nihilisme
- ook: psychotische angst, ernstige derealistatie (dissociatie), stemmingscongruent of incongruent (etc.))
- Bijkomende menging middelengebruik altijd onderliggende etioogie (entrapment) onderzoeken



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

PRIMARE DESPRESSIEVE COGNITIE

- Voornamelijk depressieve gedachten, geen plotselinge reactieve somberheid
- Suïcidaliteit voornamelijk vanuit een emotioneel aspect, maar ook een existentiële doodswens
- Chronische stress



Psychosociale turmoil

Acute reactiviteit op ernstige verlieservaring, of dreigende rampen/of ernstig gezichtsverlies.

Voornamelijk verklaard door acute stress.


Impulsiviteit/temperament.



Inadequate coping/communicatie

- Benadrukken van de druk van het lijden en/of anderen aanzetten tot veranderingen (bewust of onbewust)
- Beperkte copingsvaardigheden.
- Bij hulpverleners, ervaring machteloosheid of terughoudendheid








- <https://youtu.be/LIyyUKcxxCM>
- <https://youtu.be/qD3z9giBC6o>
- <https://youtu.be/lURSK3XZ5MA>

valideringsstudies

Wordt het herkend?



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Delphi rondes voor onderzoek klinische relevantie



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

SUICIDI 2 studies

Intraclass correlatie coefficient (ICC)

ICC VALUES AND RELIABILITY

< 0.5	Slecht
$\geq 0.5 - 0.75$	Matig
$\geq 0.75 - 0.9$	Goed
≥ 0.90	Excellent

de Winter et al. *BMC Psychiatry* (2023) 23:878
<https://doi.org/10.1186/s12888-023-05374-8>

BMC Psychiatry

RESEARCH

Open Access

A first study on the usability and feasibility of four subtypes of suicidality in emergency mental health care

Remco F. P. de Winter^{1,2,3,4*}, Connie M. Meijer⁵, Anne T. van den Bos¹, Nienke Kool-Goudzwaard³, John H. Enterman³, Manuela A.M.L. Gemen¹, Chani Nuij⁴, Mirjam C. Hazewinkel³, Danielle Steentjes¹, Gabrielle E. van Son¹, Derek P. de Beurs^{4,6} and Marieke H. de Groot⁷

Ethical Considerations

The Medical Research Ethics Committee Leiden the Hague Delft involving the Human Subjects Act (*Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen*) was consulted prior to the start of this study. The committee decided in 2020 that no approval was needed (G21.021/PV/pv). The medical directorates and privacy officers of the Mental Health Institute Rivierduinen and Parnassia Mental Health Institute approved the study, and both institutes financed the study [3].

Eerste studie

1. Alle subtypen goed tot excellente ICC (95% CI) Onderste grens: moderate t/m voldoende

de Winter et al. *BMC Psychiatry* (2023) 23:878
<https://doi.org/10.1186/s12888-023-05374-8>

BMC Psychiatry

RESEARCH

Open Access

A first study on the usability and feasibility of four subtypes of suicidality in emergency mental health care

Remco F. P. de Winter^{1,2,3,4*}, Connie M. Meijer², Anne T. van den Bos¹, Nienke Kool-Goudzwaard³, John H. Enterman³, Manuela A.M.L. Gemen¹, Chani Nuij⁴, Mirjam C. Hazewinkel³, Danielle Steentjes¹, Gabriëlle E. van Son¹, Derek P. de Beurs^{4,6} and Marieke H. de Groot⁷

Average measure	ICC	95% CI lower bound	95% CI upper bound	Value	Cronbach Alpha
All types (dichotomous score)	.854	.743	.927	7.795	.872
Absolute Perceptual (PD)	.836	.713	.918	6.930	.844
Absolute Depressive (PDC)	.913	.848	.957	11.861	.916
Absolute Turmoil (PT)	.821	.683	.911	5.436	.816
Absolute Communication (IC)	.820	.586	.910	6.000	.823
Dimensional score (0–4)					
Perceptual (PD) TA	.834	.710	.917	6.478	.846
Depressive (PDC) TA	.932	.880	.966	14.70	.932
Turmoil (PT) TA	.892	.809	.946	9.992	.932
Communication (IC) TA	.823	.690	.912	6.327	.842
Dimensional score SUICIDI questionnaire (0–2)					
Perceptual (PD) SUICIDI	.802	.654	.901	5.535	.819
Depressive (PDC) SUICIDI	.871	.774	.936	8.447	.882
Turmoil (PT) SUICIDI	.851	.740	.926	7.328	.864
Communication (IC) SUICIDI	.790	.634	.895	5.150	.806

Vervolgstudie met aanpassing SUICIDI vragenlijst en terugkoppeling

Manuscript in voorbereiding



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Case	<u>Perceptual</u>	<u>Depression</u>	<u>Turmoil</u>	Coping	points	Classification (other secondary classification(s), x and - is none)
26	4	2			6	DD (PSD)
27		5		1	6	PSD (-)
28	5	1			6	DD (-)
29		4		2	6	DD (AD)
30		4	1	1	6	DD (PSD, AS)
31			2	4	6	DD (PSD)
32		6			6	DD (-)
33			6		6	PSD (AS)
34	1	5			6	AD (DD)
35	6				6	PD (-)
36		3	3		6	DD (ADD)
37		2	3	1	6	DD (-)
38			6		6	PD (DD, AS)
39	1	5			6	ADD (LI)
40	6				6	PD (AS)
41		5	1		6	DD (AD)
42		6			6	DD (-)
43		3	3		6	DD (-)
44			6		6	AS (-)
45	6				6	BD (-)
46		6			6	DD (-)
47	1	5			6	DD (-)
48				6	6	PSD (-)
49		1		5	6	ASD (PSD,
50		1		5	6	PSD (PTSD, DD)

Tweede studie

75 cases *manuscript in preparation*

Bijna alle subtypen excellente ICC


(95% CI) onderste grens goed t/m excellent

Average measure	ICC	95% CI lower bound	95% CI upper bound	Value	Cronbach Alpha
All types	0.947	0.926	0.964	18.96	0.947
Absolute Perceptual (PD)	0.959	0.942	0.972	24.85	0.960
Absolute Depressive (PDC)	0.918	0.885	0.944	12.84	0.922
Absolute Turmoil (PT)	0.832	0.764	0.885	6.45	0.845
Absolute Communication (IC)	0.891	0.848	0.925	9.51	0.895
Perceptual (PD) TA	0.972	0.960	0.981	36.70	0.973
Depressive (PDC) TA	0.952	0.932	0.968	23.30	0.957
Turmoil (PT) TA	0.883	0.830	0.922	10.11	0.901
Communication (IC) TA	0.924	0.893	0.948	13.68	0.927


Discussie

1. Subtypes herkend?
2. Terugkoppeling belangrijk!
3. SUICIDI vragenlijst verbeterd!
4. Gevalideerd!
5. Verdere differentiatie nodig?
6. Voor beter maatwerk van zorg?
7. **Eerste klinische gevalideerde model!**





Limitaties



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

Further research.....

1. Klinisch/demografisch?
2. Verschillende prevalentie ?
3. GGZ Fryslân ?
4. Psychologische autopsie ?
5. Overlapping?
6. Ernstmaat?
7. Andere factoren?
8. Netwerkteorie?
9. Behandelalgoritmen?
10. Historisch?



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip

KINDLY THANK YOU FOR YOUR INTEREST
ARE THERE ANY QUESTIONS?

REVIEWING PRESENTATION?

MORE INFORMATION?


Remco de Winter, Connie Meijer, Anne van den Bos,
Nienke Kool, John Enterman, Manuela Gemen, Mirjam Hazewinkel,
Danielle Steentjes, Chani Nuij, Derek de Beurs, **Marieke de Groot**
&
*Riet Lochy,, Roland van der Sande, Melissa Hoek-Hus, Wilma
Neumann, Arjan van den Berg, Mieke Hartgers, Aram van Reijssen,
Hazewinkel, Ad Kerkhof*

www.suicidaliteit.nl



Emile Durkheim, sociologist 1858–1917

1. Concerns suicides (protestants, catholics, soldiers en civilans)
2. 4 types of suicide deaths (end product suicidality)
 - Egoistics (IC)
 - Altruistics (PD)
 - Anomic (PT)
 - Fatalistic (PDC)



GGZ Rivierduinen
Het begint bij begrip



	PD	PDC	PT	IC	
Totaal	73 (12.2%)	239 (39.3 %)	132 (22.0%)	156 (26.0%)	600 (100%)